

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра ортодонції

МОТИВАЦІЯ
ДО ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ
У ДІТЕЙ В ЗМІННОМУ ПРИКУСІ



Карасюнок А. Є.,
Воронкова Г. В.,
Ляховська А.В.



Родина –
це найближчий соціум,
який визначає, яким саме буде вплив на
дитину всіх інших соціальних факторів.



Мета - підвищити ефективність ортодонтичного лікування дітей із зубощелепними аномаліями в змінному прикусі та посилити їх мотивацію до лікування впливом на ортодонтичну поінформованість батьків

Матеріали та методи

Розподіл пацієнтів (60 дітей) по групах




Комплексне ортодонтичне лікування

100% - лікувалися знімними ортодонтичними апаратами



60% - виконували міогімнастичні вправи



53% - отримали хірургічну допомогу





Авторське право на твір № 18946 - інформаційний відеофільм «Батькам про ортодонтію та ортодонтичне лікування»

**Пам'ятки
про особливості
ортодонтичного
лікування**

*МОЗ України
Українська медична
стоматологічна академія*

***Профілактика
зубощелепних
аномалій***

Полтава - 2007

*МОЗ України
Українська медична
стоматологічна академія*

***Правила
ортодонтичного
лікування***


Полтава - 2007

*МОЗ України
Українська медична
стоматологічна академія*

***Правила
користування
ортодонтичним
апаратом***


Полтава - 2007

Рівень поінформованості батьків про ортодонтичне лікування




Оцінка ефективності ортодонтичного лікування

Дисциплінованість пацієнтів (несвоєчасне відвідування ортодонта)



Оцінка ефективності ортодонтичного лікування

Переривання ортодонтичного лікування



Оцінка ефективності ортодонтичного лікування

Тривалість ортодонтичного лікування (міс.) ($M \pm m$)

Вид патології (за Енглем)	Термін лікування пацієнтів (міс.)		p<
	Групи		
	Досліджувана	Контрольна	
I клас (n = 16)	11,56 ± 0,65	18 ± 0,97	0,001
II клас (n = 14)	13,85 ± 0,66	21,42 ± 0,96	0,001

Висновки

Інформування батьків допомагає підвищити мотивацію дітей до ортодонтичного лікування, що проявляється зниженням рівня переривань лікування, підвищенням дисциплінованості пацієнтів і скороченням термінів лікування.