



Полтавський державний медичний університет

**Динаміка змін клінічних показників у пацієнтів
з флегмонами щелепно – лицевої ділянки з
застосування кріоконсервованої плаценти**

Кіптілій А.В



*

Мета дослідження:

- * Вивчити динаміку клінічних показників, щодо перебігу процесів репарації у пацієнтів з флегмонами щелепно-лицевої локалізації при застосуванні в складі комплексної терапії кріоконсервованих клітин плаценти в порівнянні із стандартним протоколом надання медичної допомоги.

Оцінка динаміки змін загального стану хворих з флегмонами щелепно – лицевої локалізації

№ п/п	Показник	Кількість балів
1	Показник П 1.1 - температура: - до 37,0°C; - 37,1-38,0°C; - 38,1-39,0°C; - вище 39,0°C.	0 1 2 3
2	Показник П 1.2 - пульс: - до 80 ударів в хвилину; - до 81-90 ударів в хвилину; - до 90-100 ударів в хвилину; - вище 100 ударів в хвилину.	0 1 2 3
3	Показник П 1.3 - біль: - немає; - локалізований; - розповсюджений; - розповсюджений з іррадіацією.	0 1 2 3
4	Показник П 1.4 - порушення функції жування: - не спостерігається; - спостерігається.	0 1
5	Показник П 1.5 - порушення функції ковтання: - не спостерігається; - спостерігається.	0 1
7	Показник П 1.6 - порушення функції мови: - не спостерігається; - спостерігається.	0 1

Оцінка динаміки локальних змін у хворих з флегмонами щелепно – лицевої локалізації

№ п/п	Показник	Кількість балів
1	Показник П 2.1 - колатеральний набряк:	
	- не спостерігається;	0
	- спостерігається.	1
2	Показник П 2.2. - відкривання рота:	
	- нормальне;	0
	- до 3 см;	1
	- до 2 см;	2
	- до 1 см.	3
3	Показник П 2.3. - обмеження рухів язика:	
	- не спостерігається;	0
	- спостерігається.	1
4	Показник П 2.4 - клітковинні простори, що залучені у гнійно-запальний процес та їх кількість:	1
	- до 2х просторів;	2
	- до 3х просторів;	3
	- більше 3-х просторів;	
5	Параметр 2.5 - особливості стану тканин рани:	
	- кровоточать, червоного кольору;	1
	- рана, що очищується від некротичних мас;	2
	- мають вигляд вареного м'яса;	3
	- сірого кольору з некрозом.	4

Оцінка динаміки клінічних змін у гнійній рані у хворих з флегмонами щелепно – лицевої локалізації

№ п/п	Показник	Кількість балів
1	Показник П 3.1 - кількість гнійного ексудату:	
	- не спостерігається;	0
	- невелика;	1
	- рясна.	2
2	Показник П 3.2 - наявність грануляційної тканини:	
	- рана, що рясно гранулює;	0
	- незначна кількість грануляційної тканини (перші ознаки);	1
	- тканина, що гранулює відсутня.	2
3	Показник 3.3 - епітелізація рани:	
	- повна епітелізація;	0
	- перші ознаки;	1
	- відсутня.	2

*

Висновок

- * Дослідження показали, що найбільш значні зміни в загальному стані пацієнтів спостерігаються за показником П-1.3 у другій клінічній групі. На 3-й день спостереження відбувається зменшення на 0.47% бала у 67.8% пацієнтів, а на 5-й день — на 0.83% бала у 83.7% пацієнтів, незалежно від їхнього хронотипу.
- * Щодо локальних змін у рані, найбільш достовірне зниження зафіксовано за показником П-2.2 на $1.52\% \pm 0.17\%$ на 5-й день після оперативного втручання у 83% пацієнтів з ранковим хронотипом, які були прооперовані вранці.
- * У показниках клінічних змін у гнійній рані встановлено достовірне зменшення всіх трьох показників у другій клінічній групі, особливо на 7-й день спостережень. Різниця в балах складає $1.15\% \pm 0.21\%$, $1.08\% \pm 0.15\%$ та $1.18\% \pm 0.17\%$ порівняно з першим днем після операції. Це спостерігається у 87.2% пацієнтів з ранковим хронотипом, які були прооперовані вранці, та у 74.4% пацієнтів з вечірнім хронотипом, які були прооперовані ввечері.
- * Такі результати дозволяють накладати вторинні шви вже на 7-й день, скорочують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі в середньому на 1.47 дня та підтверджують ефективність запропонованого методу лікування.